Drug-resistant MS spasticity treatment with Sativex® add-on and driving ability.

In Acta neurologica scandinavica. Vol.131, n° 1, pages 9–16, 01/2015. [accès réservé]

Thème:
Europe - drogues et médicaments [1]

Date du document:
Jeudi Janvier 1 2015

Visibilité du contenu de groupe:
Use group defaults

Résumé:
Allemagne. L'objectif de l'étude est de déterminer les effets du delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) et du cannabinol (CBD), contenus dans le spray buccal Sativex, dont l'indication thérapeutique concerne le traitement symptomatique de la spasticité liée à la sclérose en plaques des patients adultes, résistante aux autres traitements. La cohorte comprend 33 patients souffrant d'une spacicité modérée à sévère, observés sur une durée de 4-6 semaines. Une série de cinq tests a été effectuée afin d'évaluer l'aptitude à la conduite des patients de l'échantillon. Conclusion : le traitement des patients traités par Sativex n'a pas d'impact négatif sur l'aptitude à la conduite et permet une amélioration de la spacicité résistante aux traitements.

Auteur(s):
M. Freidel et al.

Lien(s) utile(s)

- http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ane.12287/abstract;jsessionid=460CF175B3726DA26E7 [2]

Retour à la base documentaire [3]